

Medicinrådets opstarts- og stopkriterier for vorasidenib til behandling af IDH1- eller IDH2-muteret astrocytom eller oligodendrogliom WHO-grad 2

Afgrænsning af patientpopulation

Vorasidenib kan tilbydes patienter, som har:

- IDH1- eller IDH2-muteret astrocytom eller oligodendrogliom WHO-grad 2
- Patienten har alene modtaget kirurgisk behandling og har ikke tidligere modtaget strålebehandling eller kemoterapi
- Patienten har ikke aktuelt behov for umiddelbar strålebehandling eller kemoterapi
- Der foreligger målbar resttumor på MR (RANO)
- God funktionsevne, svarende til KPS $\geq$ 80

Startkriterier

Patienter med målbar resttumor vurderet efter RANO-kriterier:

- Opstart efter operation/biopsi efter patienten er restitueret
- Intet behov for umiddelbar strålebehandling eller kemoterapi
- Informeret drøftelse med patienten af vorasidenib over for aktiv observation

Patienter uden målbar resttumor vurderet efter RANO-kriterier:

- Patienten følges indledningsvist med aktiv observation efter operation
- Opstart kan overvejes ved tumorvækst, evt. efter re-operation, men før der opstår behov for strålebehandling eller kemoterapi

Stopkriterier

- Progression vurderet efter RANO-kriterier
- Behov for strålebehandling, kemoterapi eller anden kræftbehandling
- Uacceptabel toksicitet
- Manglende forventning om fortsat klinisk gavn efter en samlet klinisk vurdering